

# Cassius®

## GRANULADO DISPERSABLE

### COMPOSICIÓN

rimsulfuron:

N-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl) aminocarbonyl)-3 -(ethylsulfonyl)-2 pyridinesulfonamide..... 25 g  
inertes y coadyuvantes c.s.p. .... 100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

INSCRIPTO EN EL SENASA CON EL NRO. 42.216

Origen: CHINA

FECHA DE VENCIMIENTO: (Ver en el envase)

CONTENIDO NETO: (Ver en el envase)

LOTE N°: (Ver en el envase)

### NO INFLAMABLE

Registrado por:



Catamarca 1695 (C1246AAI) C.A.B.A., Argentina  
Tel./fax: (54-11) 4942-8880  
info@fcagro.com.ar / www.fcagro.com.ar

**NOTA** No estando el almacenamiento ni su aplicación bajo nuestro control, la firma no acepta ninguna responsabilidad por daños eventuales a personas, animales o cultivos causados por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.

### PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
  - NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
  - INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
  - EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
  - EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
  - PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.
- LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:** • Lavar con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto luego del manejo y aplicación como así también la ropa utilizada. / • No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. En todos los casos lavarse previamente las manos.

• Lavar las ropas y equipos de protección utilizados separados del resto de la ropa común, utilizando detergente y agua caliente. / • Evitar la ingestión, inhalación, y contacto directo con los ojos, piel, y boca.

**Equipos de protección personal:** Para la carga del equipo y la aplicación debe utilizarse el siguiente equipo: protector facial y gorra con protección para la nuca, camisa de mangas largas y pantalones largos –o enterizo de Tyvek®, botas de goma con medias y guantes de goma de butilo, natural, neopreno o de nitrilo, siempre > a 0.3556 milímetros. / Para la limpieza y mantenimiento del equipo de protección seguir las instrucciones del fabricante del mismo, en caso de no tenerlas disponibles usar detergente y agua caliente. Mantener siempre separado de otras prendas a lavar.

**RIESGOS AMBIENTALES:** Aves: Prácticamente no tóxico. / Peces: Prácticamente no tóxico. / Abejas: Virtualmente no tóxico. No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ni de áreas donde puedan extender sus raíces ya que pueden resultar dañadas. No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. Dejar una zona de seguridad sin aplicar (zona buffer), de al menos 10 metros de ancho de cualquier curso de agua.

**TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:** Los sobrantes de caldo de pulverización que no se utilicen, pueden ser pulverizados a dosis normales de uso en áreas no cultivadas (alambrados, bordes de caminos), donde no accedan personas y asegurándose de no contaminar fuentes de agua o alimentos.

### TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS

Está prohibido por ley volver a utilizar, enterrar o quemar los envases. Entregar los envases por fuera de un sistema aprobado es infracción a la normativa ambiental. Para bidones y botellas de plástico respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado (TL) o Lavado a Presión (LP) siguiendo la Norma IRAM 12.069: TL - Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. LP - Se acciona el dispositivo 30 segundos. Considerar en el volumen de la mezcla al igual que para TL. Finalmente, para ambos procedimientos inutilizar el envase perforándolo en la base, intentando no dañar la etiqueta. Los envases deben entregarse en Centros de Almacenamiento Transitorio de la A.C. CampoLimpio SGE habilitados para su derivación a reciclado o disposición final, según la Ley Nacional N° 27.279 y reglamentación de autoridades competentes locales.

### ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados en locales seguros, secos, bien ventilados al resguardo de la luz solar y evitando que se humedezca. Almacenar alejado de todo tipo de alimentos, insecticidas, fungicidas, semillas, forrajes y fertilizantes. No comer, beber ni fumar en estos lugares. Mantener alejados de toda fuente de calor, llamas o chispas; de ser factible, almacenar en sitios provistos de sistemas automáticos de extinción de incendios.

**DERRAMES:** **Producto sin preparar:** recoger con pala el producto y colocarlo en un recipiente rotulado, cubrir con solución de lavanda (0.5 litros cada 100 litros de agua) para inactivar. Disponer de acuerdo a la normativa local vigente.

**Producto preparado:** crear una barrera con tierra, arena o vermiculita de contención para el derrame. Evitar que el material tome contacto con cloacas, cursos de agua o áreas bajas. Cubrir el producto con un material absorbente (arena, tierra, aserrín), y luego recogerlo con pala. Si el derrame se produce en cercanía de plantas o árboles, remover 5 cm de tierra superficial después de la limpieza inicial. Colocar los desechos en bolsas contenedoras rotuladas y enviar a empresas especializadas en la destrucción de este tipo de residuo.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En cualquier caso conservar la etiqueta y conseguir ayuda médica inmediata.

**Ingestión:** NO INDUCIR AL VÓMITO

No se indica tratamiento específico, aplicar tratamiento sintomático. No suministrar nada por boca si la persona está inconsciente. Consultar inmediatamente al médico con la etiqueta del producto a mano.

**Contacto ocular:** lavar los ojos manteniendo los párpados abiertos durante 15-20 minutos con abundante agua. Retirar a los 5 minutos los lentes de contacto y seguir lavando. Consultar a un centro médico para la continuación del tratamiento. / **Contacto con la piel:** Quitar los zapatos y las ropas contaminadas. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón y enjuagar durante 15-20 minutos. Lavar las ropas antes de reutilizarlas. / **Inhalación:** Retirar la persona afectada al aire fresco. Mantener a la persona afectada en reposo y abrigada. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. Si no respira, realizar respiración artificial.

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:** Clase toxicológica (OMS 2009): IV - PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO.

**IRRITACIÓN OCULAR:** MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA III: Causa irritación moderada a los ojos.

**TOXICIDAD INHALATORIA:** CATEGORIA II (NOCIVO).

No irritante dermal. No sensibilizante dermal.

No existe antídoto específico; aplicar tratamiento sintomático.

**SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:** No se conocen síntomas específicos de intoxicación aguda. Durante la preparación y aplicación utilizar siempre los elementos de protección indicados en esta etiqueta.

**CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. / Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247 / Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas xHaedo - Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777 Comutador: (011) 4469-9300 internos 1101 al 1103. Línea gratuita: 0800-333-0160. / Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas J. de San Martín - Buenos Aires - Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806 / Centro de Consultas Toxicológicas CASAFE. Llamar a TAS durante las 24 hs. Tel.: (0341) 424-2727



CUIDADO



**GENERALIDADES:** CASSIUS® es un herbicida exclusivamente de uso agrícola, para el control selectivo de malezas de hoja ancha y gramíneas indicadas en las recomendaciones, en barbecho químico y en los cultivos de tomate, papa y maíz.

CASSIUS® actúa inhibiendo la enzima acetolactasa sintasa (ALS), la cual es clave en la vía de biosíntesis de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina, los cuales son vitales para los procesos de crecimiento de las plantas.

CASSIUS® debe ser aplicado a malezas jóvenes (hasta dos hojas) y en activo crecimiento. La absorción del producto se produce por vía radicular y foliar, inhibiendo rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles.

En algunos casos, las malezas susceptibles pueden germinar y emerger pocos días después de la aplicación, pero el crecimiento cesará y las hojas empezarán a ponerse cloróticas entre 3 y 5 días después de la emergencia, cesando la competencia con el cultivo. Los síntomas de CASSIUS® (clorosis y decoloración) se hacen evidentes entre 7 y 21 días después de la aplicación. Un crecimiento vigoroso y el sombreado producido por el cierre del cultivo, complementarán el control.

**INSTRUCCIONES DE USO: PREPARACIÓN:** 1. Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia o filtrada, hasta ½ - ¾ de su capacidad.

2. Agregar directamente al tanque de aplicación la cantidad requerida de CASSIUS® según dosis de uso y superficie a tratar.

3. Mezclar enérgicamente con el agitador o manualmente para dispersar completamente el producto.

4. Completar la carga de agua del tanque y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento para lograr la total homogeneidad del preparado.

**EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:** CASSIUS® puede ser aplicado con cualquiera de los equipos pulverizadores utilizados habitualmente en los cultivos recomendados.

Se deben utilizar caudales de 100 a 130 l/ha, con una presión de trabajo de 40 a 60 lb/pulg<sup>2</sup> (2,75 a 4,2 bar). La barra debe estar provista de picos que proyecten en forma de abanico. Para un resultado eficaz se recomienda alcanzar 20-30 gotas/cm<sup>2</sup>.

Es importante que los equipos pulverizadores estén correctamente calibrados, con sus picos limpios y en condiciones de lograr una buena cobertura. Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua, sobre un terreno con similares características a donde se va a utilizar.

El equipo de aplicación debe estar limpio y libre de cualquier depósito de producto que se haya aplicado previamente.

**Número de gotas:** aplicar 20-30 gotas/cm<sup>2</sup>.

**LAVADO DE LOS EQUIPOS PULVERIZADORES:** Limpiar el equipo utilizado inmediatamente luego de la aplicación realizando un triple lavado: En cada uno de los lavados llenar el tanque un 25% de su capacidad con agua limpia y hacer circular la solución por todo el sistema durante 15 min (en caso de utilizar agentes limpiadores, hacerlo siguiendo las indicaciones de su respectiva etiqueta).

Retirar los picos y pastillas y lavarlos de forma individual.

Eliminar el caldo en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas, sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas, ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y de transito frecuente de personas y animales domésticos.

Es importante que esta tarea se lleve a cabo para evitar el arrastre de producto remanente en tanque a un cultivo susceptible.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

CASSIUS® debe aplicarse de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Tomate	Tomatillo ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quinoa blanca ( <i>Chenopodium album</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Nabo ( <i>Brassica campestris</i> ) Abrojo chico ( <i>Xanthium spinosum</i> ) Yuyo colorado ( <i>Amaranthus quintensis</i> ) Pasto cuaresma ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Capín arroz ( <i>Echinochloa crus galli</i> )	140 g/ha	Previo o posterior al trasplante del tomate (luego de al menos 15 días del trasplante, estando el cultivo creciendo activamente y libre de estrés). Solo en aplicaciones previas al trasplante y sobre malezas emergidas se recomienda la adición de aceite mineral o vegetal a una concentración de 0,25%. No utilizar coadyuvantes o aceites en aplicaciones posteriores al trasplante del cultivo. No deben realizarse labranzas durante un mínimo de 14 días después de la aplicación, para permitir a CASSIUS® controlar totalmente las malezas tratadas. La labranza de la tierra hasta 7 días antes de la aplicación de postemergencia de CASSIUS® puede disminuir el control de malezas por ocasionar daño en sus raíces, provocando una situación de estrés, o por cubrirlas con tierra ocasionando la no llegada del producto.
Papa		105 g/ha	Previo o posterior a la emergencia del cultivo (luego que las papas tengan al menos 15 cm de altura). En aplicaciones sobre malezas emergidas, las mismas deben encontrarse en activo crecimiento sin haber superado el estado de 2 hojas. Solo en aplicaciones de presimbra y preemergencia del cultivo y sobre malezas emergidas se recomienda la adición de aceite mineral o vegetal a una concentración de 0,25%. No utilizar coadyuvantes o aceites en aplicaciones de postemergencia del cultivo. No deben realizarse labranzas durante un mínimo de 14 días después de la aplicación, para permitir a CASSIUS® controlar totalmente las malezas tratadas. La labranza de la tierra hasta 7 días antes de la aplicación de postemergencia de CASSIUS® puede disminuir el control de malezas por ocasionar daño en sus raíces, provocando una situación de estrés, o por cubrirlas con tierra ocasionando la no llegada del producto.
Maíz	Pasto cuaresma ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto cuaresma ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) / Capín arroz ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) / <i>Chloris chloris</i> / <i>Eleusine indica</i> / <i>Urochloa</i> ( <i>Urochloa platyphylla</i> ) / Abrojo chico ( <i>Xanthium spinosum</i> ) / Rama negra ( <i>Conyza bonariensis</i> ) / Yuyo colorado ( <i>Amaranthus hybridus</i> ) (*) Yuyo colorado ( <i>Amaranthus palmeri</i> ) (*)	125-150 g/ha (****) + Glifosato (***) (dosis según indicaciones de marbete para cada formulación para este tipo de uso). 100 g/ha (**) + Glifosato (***) (dosis según indicaciones de marbete para cada formulación para este tipo de uso). + S-Metolaclor 96% EC 0,9-1,6 L/ha (1) O Acetoclor 90% EC 2-3 L/ha (1)	Siembras tempranas: aplicaciones desde 30 días previos hasta la siembra. Siembras tardías (diciembre-enero): aplicaciones desde 15 días previos hasta la siembra. La labranza antes de la aplicación de CASSIUS® puede disminuir el control de malezas. Por lo tanto, en labranza convencional, utilizar el producto exclusivamente en mezclas.
Barbecho químico	Raigras anual ( <i>Lolium multiflorum</i> )	150 g/ha	Aplicaciones hasta 100-120 días antes de la siembra de maíz

(1) Ajustar según tipo de suelo de acuerdo a las recomendaciones del marbete del producto utilizado.

(\*) Aplicar estrictamente antes de la emergencia. En el caso de malezas emergidas se recomienda la limpieza previa del lote mediante la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.

(\*\*) Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida en estado de roseta de hasta 10 cm de diámetro, previo a la emisión de la vara floral.

(\*\*\*) En caso de presencia de gramíneas emergidas tolerantes o resistentes a Glifosato puede utilizarse un graminicida del grupo de los inhibidores de ACCasa a sus respectivas dosis de marbete, efectivo para el control de este tipo de malezas.

(\*\*\*\*) Sobre malezas emergidas se recomienda la adición de aceite mineral o vegetal a una concentración de 0,25%.

#### Importante:

**PAPA • Tamaño de Maleza:** Aplicar preferentemente en pre-emergencia de la maleza o con maleza emergida pequeña en estado vegetativo (rosetas de 5-10 cm máximo, en el caso de latifoliadas, o 2-3 hojas en el caso de gramíneas). Cuando las malezas presentes en el lote superen el tamaño indicado se debe realizar una aplicación previa con un producto específico.

En el caso específico de yuyo colorado la actividad del producto es solamente pre-emergente de la maleza. Por lo tanto, en lotes con yuyo colorado ya emergido se deberá realizar la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.

**• Condiciones Ambientales:** Para el control pre-emergente de malezas, es necesaria la activación de CASSIUS® en el suelo por medio de la lluvia o el riego por aspiración, dentro de los 5 días posteriores a la aplicación, moviendo el herbicida a una profundidad de 5 a 7 cm en el perfil del suelo. En caso de ausencia de lluvias, o no poder realizar riegos, es conveniente esperar a la emergencia de las malezas para aplicar CASSIUS®. En aplicaciones sobre malezas emergidas CASSIUS® debe ser aplicado a malezas jóvenes (hasta dos hojas) y en activo crecimiento. Debe considerarse que el control puede no ser adecuado sobre malezas que posean el sistema radicular establecido antes de que ocurra la activación de CASSIUS® en el suelo.

**MAÍZ** Aplicar preferentemente en pre-emergencia de la maleza o con maleza emergida pequeña en estado vegetativo (rosetas de 5-10 cm máximo, en el caso de latifoliadas, o 2-3 hojas en el caso de gramíneas). Cuando las malezas presentes en el lote superen el tamaño indicado se debe realizar una aplicación previa con un producto específico.

Cuando el lote ha sido tratado previamente con un herbicida de contacto se deberá esperar el rebrote de las malezas para aplicar CASSIUS® según lo mencionado en el cuadro de recomendaciones.

En el caso de yuyo colorado la actividad del producto es solamente pre-emergente de la maleza. Por lo tanto, en lotes con yuyo colorado ya emergido se deberá realizar la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.

#### Rotación de cultivos:

La respuesta de los cultivos a bajas concentraciones de CASSIUS® remanentes en el suelo luego de una aplicación varían según el cultivo. A su vez las concentraciones remanentes dependerán de la humedad del suelo, temperatura del mismo, dosis aplicada, etc.

Después de la aplicación de CASSIUS® y durante el mismo año calendario se deben respetar los siguientes intervalos:

Maíz y Papa: sin restricciones; Tomate: 1 mes; cereales de invierno (Trigo): 4 meses; cereales de primavera (Trigo, Cebada, Avena): 9 meses; Maíz (pisigallo, semilla o dulce): 10 meses; Algodón: 10 meses (18 bajo condiciones de sequía después de la aplicación y antes de la siembra del algodón); Soja: 10 meses; Soja STS: 4 meses; Girasol: 10 meses; otros cultivos no listados: 18 meses.

#### Máximo número de aplicaciones por ciclo de cultivo:

Tomate: realizar un máximo de 1 aplicación posterior al trasplante por ciclo del cultivo. Papa: realizar un máximo de 1 aplicación posterior a la emergencia por ciclo de cultivo. Maíz: realizar un máximo de 1 aplicación anterior a la siembra del cultivo de maíz por ciclo del cultivo.

#### Manejo de la deriva:

Evitar la deriva de la neblina de pulverización. El potencial de deriva aumenta cuanto mayor es la velocidad del viento, y también cuando se dan condiciones muy calmas (por inversión térmica). Asimismo, cuando las condiciones ambientales al momento de la aplicación son de altas temperaturas y baja humedad relativa se facilita la deriva. Las medidas elementales para minimizar este efecto son: procurar no aplicar con vientos superiores a 8-10 km/h, o inferiores a 3 km/h, (por riesgo de inversión térmica) y pulverizar gotas de gran diámetro (>200 micras); esto último se logra empleando el mayor volumen y la menor presión recomendados.

#### Advertencias

- No aplicar a otro cultivo distinto al de tomate, papa (salvo papa semilla) o maíz (salvo maíz dulce o para semilla).
- No aplicar cuando el cultivo y las malezas estén bajo estrés consecuencia de sequías, muy bajas temperaturas, anegamiento, enfermedades, ataques de plagas, deficiencias nutricionales, entre otras, ya que en estas condiciones las malezas son menos susceptibles a la acción del herbicida, y el cultivo puede resultar afectado.
- El riesgo de los factores que causan estrés antes citados, aumenta cuando los suelos son extremadamente arenosos.
- No realizar mezcla de tanque con insecticidas organofosforados. Se debe respetar un período de 60 días entre la aplicación de CASSIUS® y la de un organofosforado para evitar daño al cultivo.
- No utilizar CASSIUS® en una solución de pulverización con un pH inferior a 4 o superior a 8; ya que puede ocasionar la degradación de CASSIUS®. Para mejores resultados, mantener el pH de la pulverización entre 5 y 7.
- No utilizar en cultivos en invernaderos.
- No aplicar si se espera que llueva dentro de las 4 horas de realizado el tratamiento, ya que el control puede ser no satisfactorio.
- No pastorear ni alimentar al ganado con granos o forrajes de zonas tratadas dentro de los 30 días previos.

**RESTRICCIONES DE USO:** Deben asegurarse los siguientes intervalos entre la aplicación y la cosecha:

Tomate: 60 días; Papa: 65 días.

Barbecho químico: exento.

La aplicación en el cultivo de maíz es en pre-siembra del mismo por lo tanto no se establece período de carencia.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas provinciales y municipales correspondientes.

#### Tiempo de reingreso a los cultivos tratados:

Puede reingresarse a los lotes tratados luego que la pulverización haya secado. De ser necesario ingresar antes de ese período utilizar los equipos de protección recomendados para la aplicación.

#### MANEJO DE RESISTENCIA:

**CASSIUS®** es un herbicida que pertenece al grupo de sitio de acción 2 y familia química de las **Sulfonilureas**. Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes se recomienda: Llegar a siembra con lotes limpios, respetar las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación, número máximo de aplicaciones por ciclo) detalladas en el marbete, realizar rotación de herbicidas con diferentes sitios de acción durante el barbecho y a lo largo del ciclo del cultivo, realizar rotación de cultivos, limpiar adecuadamente las herramientas, maquinarias y vehículos, limpiar las áreas no cultivadas y monitorear periódicamente la evolución de las malezas en los lotes y sembrar semillas de buena calidad, de origen conocido y libre de propagullos de malezas.

#### COMPATIBILIDAD:

El producto es compatible con herbicidas a base de Metribuzin, Acetoclor, S-Metolaclor.

Es incompatible con insecticidas organofosforados.

Al preparar una mezcla de tanque agregar los diferentes productos, según su tipo de formulación, en la siguiente secuencia:

1. Bolsas hidrosolubles
2. Granulos solubles en agua (SG)
3. Gránulos dispersables en agua (WG) – CASSIUS® u otros productos con esta formulación
4. Polvos mojables (WP)
5. Suspensión concentrada de base acuosa (SC)
6. Concentrados solubles en agua (SL)
7. Suspensión emulsionable (SE)
8. Suspensión concentrada de base oleosa (OD)
9. Concentrados emulsionables (EC)
10. Surfactivantes.
11. Fertilizantes solubles.
12. Antiderivados.

Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos. Los productos compatibles a ser utilizados junto con CASSIUS® deben estar registrados para ese uso particular.

**FITOTOXICIDAD:** CASSIUS® no es fitotóxico cuando es usado en las dosis indicadas y bajo las condiciones recomendadas en esta etiqueta. Bajo condiciones que generan estrés en los cultivos (por ejemplo, sequías, heladas, bajas temperaturas, altas temperaturas, o variaciones extremas de temperatura), una clorosis temporal se puede producir después de la aplicación de CASSIUS®. Los síntomas por lo general desaparecen al cabo de 5 a 15 días.

#### AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.

#### Aviso de Responsabilidad Legal

**FARM CHEMICALS ARGENTINA S.R.L.** no se responsabiliza por los daños o perjuicios de cualquier naturaleza que se deriven del uso incorrecto, diferente del indicado en este rótulo, ya que su aplicación se efectuará fuera del control del vendedor, empleando técnicas particulares y en condiciones ambientales variables. El vendedor sólo garantiza las especificaciones físicas y químicas del producto, hasta el momento que se sustraen a su control directo. La compra de este material no otorga ningún derecho de patente en otros países fuera de la República Argentina.



**CUIDADO**

